

Life Force® Natural Humic Acids

pomocná půdní látka

Žadatel: ITL Innovation Technology for Life, s.r.o., Voskovcova 1075/51, 150 00 Praha**Výrobce:** LIFE FORCE LLC, 10 A Peschano-Umetsky trakt, Saratov, Russia**Číslo rozhodnutí o registraci:** 5078**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

| Vlastnost: | Hodnota: |
|--|-----------------|
| Spalitelné látky v sušině v % min. | 75,0 |
| Sušina v % min. | 70,0 |
| Celkový dusík jako N v sušině v % min. | 1,2 |
| Huminové kyseliny v sušině v % min. *) | 50,0 |

*) **metoda stanovení ISO 19822:2018****Obsah rizikových prvků** splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0; arsen 20, chrom 50.**Life Force® Natural Humic Acids** je prášek hnědočerné barvy, s vysokým obsahem huminových látek z leonarditu.

- Regeneruje / obnovuje úrodnost vyčerpané půdy.
- Regeneruje / obnovuje kvalitu a strukturu půdy a snižuje deficit humusu.

Zlepšuje chemické, fyzikální a biologické vlastnosti půdy, je zdrojem biologicky aktivních huminových látek z leonarditu, zlepšuje úrodnost všech typů půd, zvyšuje výnos plodin.

Doporučené aplikační dávky:

| | |
|--|--|
| Pro zvýšení obsahu humusu a obsahu organického uhlíku v půdě (C) | Aplikovat do půdy po sklizni nebo před setím/výsadbou: 3-10 kg/100 m ² . |
| Polní plodiny, zelenina, luštěniny, olejnin, tráva | Před výsevem / výsadbou / aplikovat do půdy 2,5-5 kg/100 m ² . |
| Kořenová zelenina | Před výsevem: 2 - 4 kg/100 m ² . |
| Ovocné stromy a keře | Při výsadbě / přesazování: aplikovat 300 až 500 g/m ² na dno výsadbové jámy a přidat 1-4% do výplňové zeminy určené pro zasypaní jámy. Na povrch zasypané zeminy okolo stromu nebo keře: 50-100 g/m ² ročně. |
| Jahody | Před výsadbou aplikovat do půdy 400-600 g/m ² . Před začátkem vegetačního období a před květem aplikovat 200-300 g/m ² . |
| Okrasné rostliny, květiny, okrasné stromy | Pro pokojové rostliny: před sadbou aplikovat do zeminy 1,5-3%, jednou za dva měsíce v období růstu 100-200 g/m ² na povrch zeminy. Pro zahradní rostliny: při výsadbě / přesazování: aplikujte 300 až 500 g/m ² na dno výsadbové jámy a přidejte 1-4% do výplňové zeminy, určené pro zasypaní jámy. Na povrch zasypané zeminy okolo stromu nebo keře aplikovat 50-100 g/m ² ročně. Na jaře a v období aktivního růstu jednou za dva měsíce aplikovat 100-200 g/m ² osazené plochy. |
| Okrasná travní plocha | Na jaře nebo na podzim aplikovat 150–300 g/m ² , ve vegetačním období aplikovat 100 g/m ² měsíčně. |

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Vyhledejte lékařskou pomoc v případě přetrvání příznaků podráždění.

Při vdechnutí vyjdete na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících dýchacích potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypít trochu vody a vyvolat zvracení dotykem zadní části krku prstem. Doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc.

BEZPEČNOST, MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA:

Není klasifikováno jako nebezpečné pro přepravu, manipulaci a skladování. Výrobek není hořlavý a je stabilní při běžných teplotách a tlacích. Skladujte při teplotách mezi 0°C až 30°C. Zacházejte s nimi v souladu se zásadami průmyslové hygieny a bezpečnosti práce. Při manipulaci s tímto materiálem by měly být používány rukavice. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. Skladujte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly by měly být ukládány na zvláštní místa pro odpad.

DOBA POUŽITELNOSTI:

3 roky od data výroby v neporušených obalech při dodržení skladovacích podmínek.

Přípravek se dodává balený. Hmotnost balení

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže: