

**Soil Conditioner Natural Humic Acids - Leonardite 100%.****KFV 1 (A) Organické hnojivo****Výrobce:** Pharma Humica, s.r.o. Voskovcova 1075/51, 150 00 Praha**Distributor:** ITL Innovation Technology for Life, s.r.o., Voskovcova 1075/51, 150 00 Praha**Chemické a fyzikální vlastnosti:**

Vlastnost:	Hodnota:
Spalitelné látky v sušině v % min.	75,0
Sušina v % min.	70,0
Celkový dusík jako N v sušině v % min.	1,2
Huminové kyseliny v sušině v % min. *)	50,0

***) metoda stanovení ISO 19822:2018**

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg: kadmium 1, olovo 10, rtuť 1,0; arsen 20, chrom 50.

Soil Conditioner Natural Humic Acids - Leonardite 100% je prášek hnědočerné barvy, s vysokým obsahem huminových látek z Leonarditu.

- Regeneruje / obnovuje úrodnost vyčerpané půdy.
- Regeneruje / obnovuje kvalitu a strukturu půdy a snižuje deficit humusu.

Zlepšuje chemické, fyzikální a biologické vlastnosti půdy, je zdrojem biologicky aktivních huminových látek z Leonarditu, zlepšuje úrodnost všech typů půd, zvyšuje výnosy plodin.

Doporučené aplikační dávky:

Pro zvýšení obsahu humusu a obsahu organického uhlíku v půdě (C)	V každém ročním období aplikovat do půdy po sklizni nebo před setím/výsadbou: 3-10 kg/100 m ² .
Polní plodiny, zelenina, luštěniny, olejniny, tráva	Před výsevem / výsadbou / aplikovat do půdy 2,5-5 kg/100 m ² .
Kořenová zelenina	Před výsevem: 2 - 4 kg/100 m ² .
Ovocné stromy a keře	Při výsadbě / přesazování: aplikovat 300 až 500 g/m ² na dno výsadbové jámy a přidat 1-4% do výplňové zeminy určené pro zasypání jámy. Na povrch zasypané zeminy okolo stromu nebo keře: 50-100 g/m ² ročně.
Jahody	Před výsadbou aplikovat do půdy 400-600 g/m ² . Před začátkem vegetačního období a před květem aplikovat 200-300 g/m ² .

Okrasné rostliny, květiny, okrasné stromy	Pro pokojové rostliny: před sadbou aplikovat do zeminy 1,5-3%, jednou za dva měsíce v období růstu 100-200 g/m ² na povrch zeminy. Pro zahradní rostliny: Při výsadbě / přesazování: aplikujte 300 až 500 g/m ² na dno výsadbové jámy a přidejte 1-4% do výplňové zeminy, určené pro zasypání jámy. Na povrch zásypové zeminy okolo stromu nebo keře aplikovat 50-100 g/m ² ročně. Na jaře a v období aktivního růstu jednou za dva měsíce aplikovat 100-200 g/m ² osazené plochy.
Okrasná travní plocha	Na jaře nebo na podzim aplikovat 150–300 g/m ² , ve vegetačním období aplikovat 100 g/m ² měsíčně.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Vyhledejte lékařskou pomoc v případě přetrvání příznaků podráždění.

Při vdechnutí vyjdete na čerstvý vzduch. V případě přetrvávajících dýchacích potíží vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypít trochu vody a vyvolat zvracení dotykem zadní části krku prstem. Doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc.

BEZPEČNOST, MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA:

Není klasifikováno jako nebezpečné pro přepravu, manipulaci a skladování. Výrobek není hořlavý a je stabilní při běžných teplotách a tlacích. Skladujte při teplotách mezi 0°C a 30°C. Zacházejte s nimi v souladu se zásadami průmyslové hygieny a bezpečnosti práce. Při manipulaci s tímto materiálem by měly být používány rukavice. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou. Skladujte odděleně od potravin. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly by měly být ukládány na zvláštní místa pro odpad.

Minimální trvanlivost:

3 roky od data výroby. V nepoškozeném obalu v souladu s podmínkami skladování je datum minimální trvanlivosti neomezené.

Přípravek se dodává balený.

Hmotnost balení

Datum výroby:

Číslo výrobní šarže: